

予防接種	標準的な接種年齢と接種回数 (できるだけこちらの年齢内に受けましょう)			対象年齢
ロタ ロタリックス	生後2か月に至った時から24週に達するまでの間に2回 (初回接種は生後14週6日まで。2回目は1回目の接種から 27日以上あける)		経口接種です。ワクチンにより、接種間隔、 回数が異なります。ど ちらか1つを選び、接種 してください。	生後6週～24週まで (初回接種は生後14週6日 に至るまで)
ロタ ロタテック	生後2か月に至った時から32週に達するまでの間に3回 (初回接種は生後14週6日まで。それぞれの間は27日 以上あける)			生後6週～32週まで (初回接種は生後14週6日 に至るまで)
B型肝炎	生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの間に3回 (27日以上の間隔で2回接種後、1回目の接種から139日以上あける)			生後1歳に至るまで
ヒブ	接種開始年齢	初回	追加	生後2か月～5歳に至るまで
	生後2～7か月未満	4～8週の間隔で3回	3回目の接種後から7～13か月の間に1回	
	生後7～12か月未満	4～8週の間隔で2回	2回目の接種後から7～13か月の間に1回	
小児用肺炎球菌 15価 20価	1歳～5歳未満	1回		生後2か月～5歳に至るまで
	生後2～7か月未満	27日以上の間隔で3回	1歳を過ぎ3回目の接種から60日以上あけて1回	
	生後7～12か月未満	27日以上の間隔で2回	1歳を過ぎ2回目の接種から60日以上あけて1回	
	1歳～2歳未満	60日以上の間隔で2回		
四種混合 ポリオ・百日咳・ ジフテリア・破傷風 五種混合 ポリオ・百日咳・ ジフテリア・破傷風・ヒ ブ	1期初回	生後2か月に達した時から1歳に達するまでの間に3回 (それぞれの間は20日～56日あける)		生後2か月～7歳6か月未満
	1期追加	初回3回目を終了後12か月から18か月までの間隔をあけて1回		生後2か月～7歳6か月未満 (初回3回終了後6か月以上 間隔をおく)
麻しん 風しん 混合	1期	1歳から2歳に至るまでの間に1回		1歳～2歳
	2期	5歳以上7歳未満で、小学校入学前1年間(年長児)に1回 (4月1日をもって小学校入学となるため、その前の3月31日まで)		5歳以上7歳未満で小学校 入学前1年間
水痘	1回目	1歳から1歳3か月に至るまでの間に1回		1歳～3歳未満
	2回目	1回目接種終了後6か月から12か月の間隔をあけて1回		1歳～3歳未満(1回目終了後 3か月以上間隔をおく)
日本脳炎	1期初回	3歳に達した時から4歳に達するまでの間に2回 (それぞれの間は6～28日あける)		生後6か月～7歳6か月未満
	1期追加	4歳に達した時から5歳に達するまでの間に1回 (初回2回目から1年おく)		生後6か月～7歳6か月未満 (初回終了後1年おく)
	2期	11歳に達した時から10歳に達するまでの間に1回		9～13歳未満
二種混合	2期	11歳に達した時から12歳に達するまでの間に二種混合(ジフテリア・破 傷風)を1回		11歳以上13歳未満
子宮頸がん	2価	1回目接種から1か月あけて2回目、1回目接種から6か月あけて3回目		小学校6年生～高校1年生 相当年齢の女子
	4価	1回目接種から2か月あけて2回目、1回目接種から6か月あけて3回目		
	9価	1回目接種が15歳未満：1回目接種から6か月あけて2回目 (1回目と2回目の接種間隔が5か月未満の場合、3回目の接種が必要) 1回目接種が15歳以上：1回目接種から2か月あけて2回目、 1回目接種から6か月あけて3回目		